

鑲牙的方法



牙齒缺失後影響人的咀嚼功能及影響外觀，嚴重時會造成牙周組織病變及下顎關節疾病。因此，及時修復缺牙是非常重要的。

何時鑲牙最為合適？

牙齒拔除後，牙槽骨就會開始收縮。牙槽骨的收縮程度於拔牙後三個月基本上已經穩定，也是鑲牙最為合適的時機。

假牙種類

1. 活動假牙

分為全口和局部假牙，能夠隨時戴上及脫下。牙托部份一般分為膠托、鋼托或鈦金屬托。



優點

- ◆ 簡單，價錢相對相宜
- ◆ 一副假牙可以鑲一隻至數隻假牙


缺點

- ◆ 需要較長時間來適應
- ◆ 因為承托力不足，不能完全修復咀嚼功能
- ◆ 如護理不當，容易對餘下的牙齒或牙肉構成損害
- ◆ 令牙床骨加快萎縮，4-5年便需要更換

2. 牙橋

將前後牙齒磨細，形成牙樁，承托中間的牙橋部份：

「缺一顆，鑲三顆」。




優點

- ◆ 承托力足，能修復咀嚼功能
- ◆ 價錢相對適中
- ◆ 固定的修復體，不必拆除

缺點

- ◆ 需要把前後牙齒磨細，可能導致牙齒敏感，長期還可能會導致前、後牙齒牙髓發炎或壞死
- ◆ 較難清潔
- ◆ 如果因蛀牙、牙周病等原因而導致其中一顆牙樁出現問題，整個牙橋需要拆除更換



3. 種植牙

將種植體植入缺牙位置，待它與牙槽骨結合之後，裝上牙套。

優點

- ◆ 可修復單一缺牙、多顆缺牙，甚至全口修復
- ◆ 相當穩固，能夠最有效修復咀嚼及美觀功能
- ◆ 不需要影響相鄰牙齒
- ◆ 若維護和使用得當，長期效果非常好

缺點

- ◆ 涉及較複雜的手術過程
- ◆ 價錢相對昂貴